




DRA. CRISTINA DOMÍNGUEZ BELLINI  
URÓLOGA PEDIATRA

## HIPOSPADIAS

### ¿Qué es la hipospadias?

La hipospadias resulta del desarrollo incompleto de la uretra (el conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta la punta del pene). El lugar donde se encuentra la abertura a lo largo del eje del pene determina la gravedad de la patología. La abertura se puede formar en la cara inferior del eje del pene en cualquier posición desde la punta del pene hasta el escroto. Puede estar asociado con curvatura y prepucio incompleto. Su diagnóstico se realiza en el examen físico al nacimiento.



### ¿En que consiste el tratamiento de la hipospadias?

Todos los niños con hipospadias no requieren cirugía, los casos muy leves no tendrán un impacto importante en la vida de un niño. Los otros casos requieren corrección con cirugía para corregir la apertura o la curvatura del pene. Algunos casos pueden requerir más de una intervención.

Hay tres objetivos principales de la cirugía que incluyen: llevar la abertura de la uretra hasta la punta del pene, corregir la curvatura del pene, si está presente, y mejorar la apariencia del pene.

### ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía?

Los riesgos de la cirugía incluyen reacción al anestésico, sangrado, infección, estenosis del meato (estrechamiento de la abertura del pene), estenosis (estrechamiento) de la uretra, fístula (fuga a lo largo de la uretra) y divertículo uretral (saco o hinchazón de la uretra). La estenosis, la fístula y el divertículo del meato por lo general requieren una cirugía adicional para su corrección.